

「藥品給付規定」修訂對照表

第 8 節 免疫製劑 Immunologic agents

(自 111 年 10 月 1 日生效)

附表

建議修訂給付規定	原給付規定
<p>8.2.13. <u>Belimumab(如 Benlysta) :</u> (111/10/1)</p> <p>1. <u>用於接受標準治療至少 6 個月但 仍然無法有效控制疾病的第 III, IV 或 V 型狼瘡腎炎成人病人，且 需經事前審查核准後使用。</u></p> <p>(1) <u>標準治療係指同時使用以下藥物</u></p> <p>I. <u>Prednisolone≥ 0.5mg/kg/day(或相等強度劑量 之類固醇類藥物)且</u></p> <p>II. <u>使用足量前導治療(induction phase)免疫抑制劑, 含 6 個月的 mycophenolate mofetil (每日 劑量 2 克)或 mycophenolic acid(每日劑量 1440 毫克)、或 注射型的 cyclophosphamide(注射量 12 週內總劑量需達 3g)接續 3 個 月的 mycophenolate mofetil (每日劑量 2 克)或 mycophenolic acid(每日劑量 1440 毫克)或 azathioprine (每日劑量每公斤 2 毫克)。</u></p> <p>(2) <u>無法有效控制疾病的定義為經標 準治療至少 6 個月後仍有以下情 形:</u></p>	<p>無</p>

I. 蛋白尿相較基期下降比例
<50%，且 uPCR 或 24 小時蛋白
尿 ≥ 1.0

II. 腎絲球過濾率 (glomerular
filtration rate, GFR)下降超
過 20%以上且伴隨 uPCR 或 24
小時蛋白尿 ≥ 1.0 或是出現尿
沉渣。

2. 療效評估與繼續使用：每治療 12
個月需評估病人在使用期間內是
否達充分改善腎臟指標，必須達
到以下標準才可以繼續使用：

(1) 若基期蛋白尿 < 0.2 公克則 uPCR
或 24 小時蛋白尿 ≤ 1 公克。

(2) 若基期蛋白尿介於 0.2 公克和 1
公克之間，uPCR 或 24 小時蛋白
尿 ≤ 2 公克。

(3) 若基期蛋白尿 > 1 公克，蛋白尿沒
有增加超過 1 倍。

(4) 腎絲球過濾率 (glomerular
filtration rate, GFR)沒有發生
以下情形：下降超過 20%以上且
伴隨蛋白尿 > 1 公克或是出現尿沉
渣。

(5) 沒有末期腎臟病。

(6) 相較基期，血清肌酸酐沒有增加
超過 1 倍。

(7) 治療 2 年後，若腎炎已達完全緩
解者 (complete renal response,
CRR)，應停止使用 belimumab。

CRR 指病人 uPCR<0.5 且 eGFR 下
降與基期相比<10%或持續≥90
ml/min/1.73 m²。

◎附表三十六：全民健康保險狼瘡腎
炎使用 belimumab 申請表

備註：劃線部分為新修訂規定

附表三十六：全民健康保險狼瘡腎炎使用 belimumab 生物製劑申請表

醫院代號		醫院名稱		申請日期	
病人姓名		性別		出生日期	
身分證號		病歷號碼		使用期間	自 年 月 日
藥品代碼		用法用量			至 年 月 日

用於接受標準治療至少 6 個月但仍然無法有效控制疾病的第 III, IV 或 V 型狼瘡腎炎成人病人，且自體抗體陽性(anti-nuclear antibodies 或 anti-ds DNA antibodies 陽性)

1. 標準治療係指同時使用以下藥物:

1. Prednisolone $\geq 0.5\text{mg/kg/day}$ (或相等強度劑量之類固醇類藥物) 且
2. 使用足量前導治療(induction phase) 免疫抑制劑

	使用劑量	使用時間
Mycophenolate mofetil		年 月 日至 年 月 日
Mycophenolic acid(MPA)		年 月 日至 年 月 日
Cyclophosphamide		年 月 日至 年 月 日
Azathioprine (體重: ___ kg)		年 月 日至 年 月 日
其他免疫抑制劑		年 月 日至 年 月 日

2. 無法有效控制疾病的定義為經標準治療至少 6 個月後仍有以下情形:

1. 蛋白尿相較基期下降比例 $< 50\%$ ，且 uPCR 或 24 小時蛋白尿 ≥ 1.0
2. 腎絲球過濾率 (glomerular filtration rate, GFR) 下降超過 20% 以上且伴隨 uPCR 或 24 小時蛋白尿 ≥ 1.0 或是出現尿沉渣。

療效評估與繼續使用: 每治療 12 個月需評估病人在使用期間內是否達充分改善腎臟指標，必須達到以下標準才可以繼續使用：

- (1) 若基期蛋白尿 < 0.2 公克則 uPCR 或 24 小時蛋白尿 ≤ 1 公克。
- (2) 若基期蛋白尿介於 0.2 公克和 1 公克之間，uPCR 或 24 小時蛋白尿 ≤ 2 公克。
- (3) 若基期蛋白尿 > 1 公克，蛋白尿沒有增加超過 1 倍。
- (4) 腎絲球過濾率 (glomerular filtration rate, GFR) 沒有發生以下情形: 下降超過 20% 以上且伴隨蛋白尿 > 1 公克或是出現尿沉渣。
- (5) 沒有末期腎臟病。
- (6) 相較基期，血清肌酸酐沒有增加超過 1 倍。
- (7) 治療 2 年後，若腎炎已達完全緩解者 (complete renal response, CRR)，應停止使用 belimumab。CRR 指病人 uPCR < 0.5 且 eGFR 下降與基期相比 $< 10\%$ 或持續 ≥ 90 ml/min/1.73 m²。

申請醫師 (簽名蓋章) : _____

申請醫師 (簽名蓋章) : _____

專科醫師證書 : 專字第 _____ 號

醫事機構章戳 :